

فهرست

۷	فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری
۱۸	فصل دوم: کار، انرژی و توان
۳۵	فصل سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد
۵۷	فصل چهارم: دما و گرما
۸۹	فصل پنجم: الکتریسیته ساکن
۱۱۷	فصل ششم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
۱۴۶	فصل هفتم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
۱۷۵	فصل هشتم: حرکت بر خط راست
۲۰۵	فصل نهم: دینامیک
۲۲۸	فصل دهم: نوسان و امواج
۲۷۶	فصل یازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای
۳۵۰	آزمون‌های جامع
۳۱۱	پاسخ‌نامه تشریحی آزمون‌های جامع
۳۲۴	پاسخ‌نامه کلیدی
	راهنمای آیکون‌های کتاب:
	هشدار
	توجه
	حوالستان باشد
	پاسخ
	نکته
	مثال
	پادآوری



فصل هشتم حرکت برخط راست

الف) حرکت در راستای خط راست

برای شناخت حرکت، لازم است با مقاهمی زیر آشنا شویم:

مسافت و جایه جایی: مسافت کمیتی نزد های و جایه جایی کمیتی برداری است که به صورت زیر تعریف می شوند:


بردار جایه جایی (\vec{d})	مسافت (ℓ)
برداری که نقطه اول حرکت را به نقطه انتهای حرکت وصل می کند. $\vec{d} = \Delta \mathbf{x} \hat{i}$	طول مسیر حرکت

مسافت
کر
متوجه روی دایره از
نقطه (۱) به (۲) رفته است.

مسافت
از نقطه (۱) به (۲) و
سبس به (۳) رفته است.

در حالت کلی، $|\vec{d}| > \ell$ است؛ اما اگر متوجه در حرکت روی یک خط راست تغییر جهت ندهد،

$$\text{داریم: } \ell = |\vec{d}|$$



تندی متوسط و سرعت متوسط: تندی کمیتی نزد های و سرعت کمیتی برداری است و مقدار متوسط آن از فرمول های زیر به دست می آید:

سرعت متوسط	تندی متوسط
$\bar{v}_{av} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \hat{i} \Rightarrow v_{av} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t}$ علامت جبری Δx و v_{av} جهت حرکت را نشان می دهد.	$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} \rightarrow$ مسافت (m) زمان حرکت (s) \rightarrow

تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

تندی لحظه ای (v): تندی متوجه در هر لحظه از زمان یا در هر نقطه از مسیر (مثال: تندی لحظه ای یک متوجه 5 m/s است).

سرعت لحظه ای (v̇): تندی لحظه ای با در نظر گرفتن جهت حرکت (مثال: سرعت لحظه ای همان متوجه 5 m/s به طرف شمال است).

وقتی می گوییم «تندی» و «سرعت»، منظور مان تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای است.

متناهی روی محور x حرکت می‌کند و در مبدأ زمان از مکان $x_0 = -40 \text{ m}$ می‌گذرد و در لحظه $t_1 = 6 \text{ s}$ به مکان $x_1 = 100 \text{ m}$ می‌رسد و در نهایت در لحظه $t_2 = 10 \text{ s}$ از مکان $x_2 = 20 \text{ m}$ می‌گذرد. سرعت متوسط این متناهی در SI در این 10 s کدام است؟ (تبریز ۹۸)

۲۰۴) 2 m/s ۲۰۳) 6 m/s ۲۰۲) 14 m/s ۲۰۱) 22 m/s

کافی است اطلاعات مفید مسئله را در فرمول $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ بگذاریم:

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_0}{t_2 - t_0} = \frac{20 - (-40)}{10 - 0} = \frac{60}{10} = 6 \text{ m/s}$$

(همین طور که دیدید $x_1 = 100 \text{ m}$ ، $t_1 = 6 \text{ s}$ اطلاعات بی مصرف و اضافی بودن.)

شتاب

هرگاه سرعت جسمی تغییر کند، حرکت آن شتابدار است. شتاب متوسط از فرمول زیر حساب می‌شود:

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (\text{m/s})$$

تبغیر سرعت $\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ شتاب متوسط برای حرکت در یک راستا (m/s)

بازه زمانی تغییر سرعت (s)

شتاب لحظه‌ای \bar{a} : شتاب متناهی در هر لحظه از زمان

وقتی می‌گوییم «شتاب» منظورمان شتاب لحظه‌ای است.

جهت‌ها: جابه‌جایی، سرعت و شتاب کمیت‌هایی برداری هستند و تعیین جهت آن‌ها برای ما مهم است. برای حرکت در راستای محور X ، این جهت‌ها را به شکل زیر تعیین می‌کنیم:
جهت جابه‌جایی: اگر متناهی به سمت X مثبت برود، جابه‌جایی مثبت و اگر به سمت X می‌منفی باشد، جابه‌جایی منفی است.

جهت سرعت بردار سرعت همواره با بردار جابه‌جایی هم جهت (هم علامت) است.

جهت شتاب: بردار شتاب با بردار تغییر سرعت (و نه خود سرعت) هم جهت (هم علامت) است؛ یعنی:

لف سرعت ثابت $\Rightarrow \Delta v = 0 \Rightarrow$ شتاب صفر ($a = 0$)

ب سرعت در جهت مثبت و در حال زیادشدن $\Rightarrow \Delta v > 0 \Rightarrow$ شتاب مثبت ($a > 0$)

ب سرعت در جهت منفی و در حال کم شدن $\Rightarrow \Delta v < 0 \Rightarrow$ شتاب منفی ($a < 0$)

ب سرعت در جهت منفی و در حال زیادشدن $\Rightarrow \Delta v < 0 \Rightarrow$ شتاب منفی ($a < 0$)

ب سرعت در جهت مثبت و در حال کم شدن $\Rightarrow \Delta v > 0 \Rightarrow$ شتاب مثبت ($a > 0$)

متناهی در مسیر مستقیم حرکت می‌کند و معادله سرعت – زمان آن در SI، به صورت

$v = 2t^2 - 4t + 2$ است. شتاب متوسط آن در ۲ ثانیه دوم متر بر مجدور ثانیه است؟

۲۰۱) 1 m/s^2 ۲۰۲) 4 m/s^2 ۲۰۳) 6 m/s^2 ۲۰۴) 8 m/s^2

گام اول **گام اول** چند صفحه جلوتر درباره t ثانیه 1 m خواهیم خواند؛ اما این جا لازم

است بدانیم که ۲ ثانیه دوم حرکت، یعنی از $t_1 = 2 \text{ s}$ تا $t_2 = 4 \text{ s}$. برای این که شتاب متوسط در این بازه را به دست آوریم باید سرعت لحظه‌ای در ابتداء و انتهای این بازه را تعیین کنیم:




معادله سرعت - زمان برابر $v = 2t^2 - 4t - 2$ است؛ پس داریم:

$$t = 2 \text{ s} \Rightarrow v_1 = 2(2)^2 - 4(2) - 2 = -2 \text{ m/s}$$

$$t = 4 \text{ s} \Rightarrow v_2 = 2(4)^2 - 4(4) - 2 = 14 \text{ m/s}$$

گام دوم با توجه به این که شتاب متوسط از رابطه $a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ به دست می‌آید، داریم:

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{14 - (-2)}{4 - 2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ m/s}^2$$



معرفی کلی نمودارهای حرکت

نمودار مکان - زمان

از این نمودار می‌توان اطلاعات زیر را به دست آورد:

- مکان جسم در هر لحظه: x_1 مکان جسم در لحظه t_1 و x_2 مکان جسم در لحظه t_2 است.

- سرعت متوسط: سرعت متوسط متحرک بین دو لحظه از زمان، برابر شیب خطی است که نقاط متناظر با آن دو لحظه را به هم وصل می‌کند.

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \text{شیب خط (1)}$$

- سرعت لحظه‌ای: شیب مماس بر نمودار در یک نقطه، برابر سرعت لحظه‌ای متحرک در آن لحظه است.

$$\text{سرعت لحظه‌ای متحرک در لحظه } t_1 = \text{شیب خط (2)}$$

● دور و نزدیک شدن به مبدأ:

دورشدن نمودار از محور افقی (t) به معنای دورشدن متحرک از نزدیک شدن به مبدأ است.


- ساکن‌بودن: اگر نمودار $-x$ در بازه‌ای از زمان، خطی افقی موازی محور t باشد، نشان‌دهنده ساکن‌بودن متحرک در آن بازه زمانی است. همین‌طور اگر خط مماس بر نمودار در یک لحظه افقی باشد، یعنی متحرک در آن لحظه ساکن بوده است.

- تغییر جهت متحرک: در لحظه‌هایی که نمودار بیشینه یا کمینه است، متحرک در حال تغییر جهت است. (مثالاً در نمودار بالا در لحظه t_2 متحرک تغییر جهت می‌دهد).

نمودار سرعت - زمان

از این نمودار می‌توان اطلاعات زیر را به دست آورد:

- سرعت متحرک در هر لحظه: در نمودار مقابل، سرعت متحرک در لحظه t_1 برابر v_1 است.



- تغییر جهت متحرک: در لحظه‌ای که نمودار، محور t را قطع می‌کند و علامت سرعت در دو طرف آن متفاوت می‌شود، متحرک تغییر جهت داده است. در نمودار $-v$ مقابل، لحظه تغییر جهت متحرک است.


● جابه‌جایی: مساحت سطح محصور بین نمودار و محور t برابر با جابه‌جایی متحرک است. اگر این سطح بالای محور t باشد، جابه‌جایی در جهت مثبت و اگر پایین محور t باشد، جابه‌جایی در جهت منفی است. جابه‌جایی کل، مجموع تمام جابه‌جایی‌های مثبت و منفی است. در نمودار صفحهٔ قبل:

$$\left. \begin{aligned} t_2 &= S_1 + S_2 \\ t_2 &= S_2 - S_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} t_2 &= \text{جابه‌جایی در بازه زمانی } t_1 \text{ تا } t_2 \\ t_2 &= \text{جابه‌جایی بین دو لحظه } t_1 \text{ تا } t_2 \end{aligned}$$

● مسافت: مجموع مساحت سطوح‌های محصور بین نمودار و محور t (بدون در نظر گرفتن علامت منفی برای سطوح‌های زیر محور t) برابر با مسافت طی شده توسط متحرک است. در نمودار صفحهٔ قبل:

$$t_2 = |\text{مسافت طی شده در بازه } t_1 \text{ تا } t_2| = |S_1| + |S_2|$$

● شتاب متوسط: شیب خط واصل بین دو نقطه از نمودار v - t ، برابر شتاب متوسط در آن بازه زمانی است.



$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \text{شیب خط (۱)}$$

$$= t_2 - t_1 = \text{شتاب متوسط بین زمان‌های } t_1 \text{ تا } t_2$$

● شتاب لحظه‌ای: شیب خط مماس بر نمودار v - t در یک لحظه، برابر شتاب لحظه‌ای متحرک در آن

شتاب لحظه‌ای در لحظه t_1 شیب خط t_1 لحظه است.

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X ها

حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. شتاب متوسط


متحرک در بازه زمانی t_1 تا t_2 = 15 s بر مربع

ثانیه است؟ (تهری فارج ۹۳ - مشابه تهری ۹۲ - مشابه تهری ۱۹)

۰ / ۴ (۱)

۰ / ۶ (۲)

۰ / ۸ (۳)



گام اول سرعت متحرک در لحظه $t_1 = 4 \text{ s}$ را تعیین می‌کنیم. برای این کار باید

شیب نمودار را در بازه t_1 تا $t_2 = 10 \text{ s}$ به دست آوریم و برای آن از مختصات دو لحظه

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{9 - 0}{10 - 4} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \text{ استفاده می‌کنیم: شتاب نمودار}$$


$$y = ax + b \Rightarrow v = at + v_0 \Rightarrow v = \frac{3}{2}t + v_0$$

برای تعیین v_0 ، مقدار $v = 9 \text{ m/s}$ را به ازای $t = 10 \text{ s}$ در رابطه به دست آمده قرار می‌دهیم:

$$9 = \frac{3}{2} \times 10 + v_0 \Rightarrow v_0 = -6 \text{ m/s}$$

گام دوم سرعت نهایی متحرک در لحظه $t = 15 \text{ s}$ برابر صفر است؛ بنابراین:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{0 - (-6)}{15 - 0} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ m/s}^2$$



نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی که حرکت متحرک خلاف جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟ (ریاضی ۹۳ - مشابه تبریزی قارچ - مشابه ریاضی ۱۹)

$$2 / 5 (۲)$$

$$10 / 4$$

$$1 / 5$$


$$7 / 5 (۳)$$

آن، زیر محور t قرار دارد. در لحظه t' سرعت متحرک صفر شده و از آن لحظه تا $t = 25\text{ s}$ در خلاف جهت محور x ها حرکت کرده است.


مساحت سطح رنگ شده برابر است با جایه‌جایی متحرک در خلاف

$$\text{جهت محور } x \text{ ها؛ بنابراین داریم: } v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{|S|}{25 - t'}$$

$$= \frac{| \frac{-15 \times (25 - t')}{2} |}{25 - t'} = \frac{15}{2} = 7.5 \text{ m/s}$$



نمودار شتاب-زمان




این نمودار، شتاب متحرک در هر لحظه را نشان می‌دهد و سطح محصور بین نمودار و محور t در یک بازه زمانی، نشان‌دهنده تغییر سرعت متحرک در آن بازه است. $S = \Delta v$

تندشونده، کندشونده، یکنواخت

حرکت کندشونده	حرکت یکنواخت	حرکت تنداشونده
حرکتی است که در آن، اندازه سرعت متحرک در حال کم شدن است. حرکت کندشونده $a \cdot v < 0 \Leftrightarrow$	حرکتی است که در آن، سرعت متحرک ثابت باشد. حرکت با سرعت ثابت $\Leftrightarrow a = 0 \Rightarrow$	حرکتی است که در آن، اندازه سرعت متحرک در حال زیاد شدن است. حرکت تنداشونده $a \cdot v > 0 \Leftrightarrow$
نژدیکشدن نمودار سرعت t به محور	حرکت کندشونده \Leftrightarrow افقی بودن نمودار سرعت	دورشدن نمودار سرعت از محور t \Leftrightarrow حرکت تنداشونده

کدام نمودار، مربوط به متوجهی است که در بازه زمانی نشان داده شده، حرکت آن پیوسته

تندشونده است؟



گزینه ۱ = حرکت تندشونده حرکتی است که طی آن، اندازه سرعت جسم همواره در حال افزایش است. در ۲ و ۳ اندازه سرعت در حال کاهش است. در ۴ اندازه سرعت ابتدا کاهش و پس از صفرشدن افزایش یافته است. فقط در ۱ است که اندازه سرعت از زمان t_1 تا t_2 در حال زیادشدن است.

حرکت با سرعت ثابت

اگر در یک حرکت، تندی (اندازه سرعت) و جهت سرعت متوجه (جهت حرکت متوجه) در طول مسیر ثابت باشد، آن حرکت را سرعت ثابت می‌نامیم.

در حرکت با سرعت ثابت، شتاب صفر ($a = 0$) و در هر بازه زمانی، سرعت متوسط مساوی سرعت لحظه‌ای ($V = v_{av}$) است.

$$x = v t + x_0 \quad \text{مکان متوجه در لحظه } t$$

زمان (s)

معادله حرکت با سرعت ثابت:

نمودارهای حرکت با سرعت ثابت: اگر معادله بالا را در صفحه $t - x$ رسم کنیم، نمودار خطی است که شیب آن برابر v و عرض از مبدأ آن x_0 است. تمام نمودارهای این حرکت را در جدول زیر می‌بینید:

نمودار مکان - زمان	نمودار سرعت - زمان	نمودار شتاب - زمان	وضعیت متوجه
x $x_0 > 0$ $x_0 = 0$ $x_0 < 0$	v $(v > 0)$	a $(a = 0)$	با سرعت ثابت در جهت های مثبت حرکت می‌کند.
x $x_0 > 0$ $x_0 = 0$ $x_0 < 0$	v $(v < 0)$	a $(a = 0)$	با سرعت ثابت در جهت های منفی حرکت می‌کند.

تبديل یکاهای سرعت: برای تبدیل یکاهای (km / h) و (m / s) به یکدیگر، در حالت کلی داریم:

$$\text{km} / \text{h} \xrightarrow[\times 3/6]{\div 3/6} \text{m} / \text{s}$$

اما در بیشتر مسائل با یکی از عده‌های جدول زیر روبه‌رو می‌شویم که بهتر است آن‌ها را به خاطر بسپاریم:

$v (\text{km} / \text{h})$	$\begin{matrix} +18 \\ 18 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +18 \\ 36 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +18 \\ 54 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +18 \\ 72 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +18 \\ 90 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +18 \\ 108 \end{matrix}$
$v (\text{m} / \text{s})$	$\begin{matrix} +5 \\ 5 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +5 \\ 10 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +5 \\ 15 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +5 \\ 20 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +5 \\ 25 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +5 \\ 30 \end{matrix}$

در یک حرکت با سرعت ثابت، متوجه در لحظه‌های $t_1 = 1\text{s}$ و $t_2 = 12\text{s}$ به ترتیب در مکان‌های

$x_1 = -2 / 5 \text{ m}$ و $x_2 = 25 \text{ m}$ قرار دارد. مکان اولیه این متوجه در چند متری مبدأ بوده است؟

- (۱) صفر (۲) $-1 / 2$ (۳) $-2 / 5$ (۴) $-1 / 2$

صورت کلی معادله حرکت با سرعت ثابت را نوشت و مختصات داده شده را در آن

جای‌گذاری می‌کنیم و از حل دستگاه دو معادله – دو مجهول، مکان اولیه (x_0) را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} x_1 &= vt_1 + x_0 \\ x_2 &= vt_2 + x_0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} -2 / 5 &= v(1) + x_0 \\ 25 &= v(12) + x_0 \end{aligned}$$


معادله بالایی را از معادله پایینی کم می‌کنیم:

$$\frac{-2 / 5 = 2 / 5 + x_0}{\text{در معادله اول قرار می‌هیم}} \Rightarrow x_0 = -5 \text{ m}$$

نمودار مکان – زمان دو متوجه A و B به صورت شکل

مقابل است. سرعت متوجه A چند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متوجه B است؟

(تهری فارج ۹۴)



۱۲)

۱۲/۶ (۲)

۱۶)

۱۶/۳ (۴)

گزینه «۳» روش اول: نمودار داده شده، دو متوجه در حرکت با سرعت ثابت را نشان

می‌دهد. معادله حرکت با سرعت ثابت را برای هر کدام می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} x_A &= v_A t + x_{A0} \\ x_B &= v_B t + x_{B0} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 65 &= v_A (30) + x_{A0} \\ 60 &= v_B (30) + x_{B0} \end{aligned}$$

$$5 = 30(v_A - v_B) + (x_{A0} - x_{B0})$$

با توجه به نمودار، $x_A - x_B = -43^\circ m$ ؛ در نتیجه داریم:

$$50^\circ = 3^\circ(v_A - v_B) - 43^\circ \Rightarrow v_A - v_B = \frac{50^\circ + 43^\circ}{3^\circ} = 16 \text{ m/s}$$

روش دوم: در حرکت با سرعت ثابت، سرعت لحظه‌ای و متوسط برابر است. از روی نمودار مشخص است که متحرک A در ابتدای حرکت $43^\circ m$ از متحرک B عقب‌تر و در پایان حرکت $50^\circ m$ از آن جلوتر است. پس در مدت زمان $S = 3^\circ$ ، متحرک A به اندازه $43^\circ + 50^\circ = 48^\circ m$ بیشتر

$$v_A - v_B = \frac{\Delta x_A - \Delta x_B}{3^\circ} = \frac{48^\circ}{3^\circ} = 16 \text{ m/s}$$

از متحرک B حرکت کرده است.

معادلات حرکت باشتاب ثابت

در این حرکت، شتاب متوسط مساوی شتاب لحظه‌ای ($a = a_{av}$) است. در بررسی حرکت با شتاب ثابت، چند معادله اصلی داریم که کمیت‌های v ، x ، t را به هم مربوط می‌کنند. در حل هر تست باید ببینیم که داده‌ها و خواسته سؤال چیست و رابطه مناسبی را که بین آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند، از بین معادله‌های زیر انتخاب کنیم.

معادله سرعت - زمان (مستقل از جابه‌جایی):

$$v = at + v_0$$

The diagram shows a rectangle with arrows indicating flow from left to right. At the top, an arrow points up labeled "شتاب (m/s²)". To its left is "v = at + v₀". Below this is an arrow pointing right labeled "(m/s)" and an arrow pointing down labeled "زمان (s)".

معادله مکان - زمان (مستقل از سرعت نهایی):

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$$

معادله مستقل از زمان:

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

The diagram shows a rectangle with arrows indicating flow from left to right. At the top, an arrow points up labeled "سرعت اولیه (m/s)". To its left is "v² - v₀²". Above this is an arrow pointing up labeled "مکان اولیه". Below the rectangle is an arrow pointing down labeled "مکان نهایی".

معادله سرعت متوسط:

$$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2}$$

معادله مستقل از شتاب:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

در معادله‌های سرعت - زمان و مکان - زمان، t حتماً یک لحظه است. حواس‌تان باشد آن را با یک بازه زمانی (Δt) اشتباه نگیرید.

برای محاسبه مکان نسبی بین دو متحرک A و B در هر لحظه می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$x_B - x_A = \frac{1}{2}(a_B - a_A)t^2 + (v_{B0} - v_{A0})t + (x_{B0} - x_{A0})$$



: متحرکی از حال سکون از مبدأ مختصات با شتاب ثابت $\ddot{a} = 1\text{ m/s}^2$ به حرکت در می‌آید. بردار مکان آن در لحظه $t = 4$ کدام است؟ (کمیت‌ها در SI است).
(ریاضی ۹۵ با تغییر)

$$\vec{d} = \vec{v}\text{i} \quad (4)$$

$$\vec{d} = 2\vec{i} \quad (3)$$

$$\vec{d} = 4\vec{i} \quad (2)$$

$$\vec{d} = \lambda\vec{i} \quad (1)$$

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \xrightarrow{a=1, v_0=0} x = \frac{1}{2} \times 1 \times 16 = 8 \quad \text{گزینه «۱»} =$$

$$\vec{d} = x\vec{i} \Rightarrow \vec{d} = 8\vec{i}$$

: دو متحرک روی خط راست با شتاب‌های ثابت a و $(a+1/5)\text{ m/s}^2$ از یک نقطه شروع به حرکت می‌کنند و بعد از مدت t ، سرعت آن‌ها به ترتیب 10 m/s و 22 m/s می‌شود. t چند ثانیه است؟
(ریاضی فارج ۹۶) $4 \quad (4)$ $6 \quad (3)$ $8 \quad (2)$ $10 \quad (1)$

: وقتی می‌گوییم متحرک شروع به حرکت کرده است، یعنی $v = 0$ ، با توجه به این، معادله $v = at$ را برای هر دو متحرک می‌نویسیم:

$$\begin{cases} v_1 = at \\ v_2 = (a+1/5)t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10 = at \\ 22 = at + 1/5t \end{cases} \xrightarrow{\substack{\text{معادله بالا را از معادله} \\ \text{پایین کنم می‌کنیم.}}} 12 = 1/5t \Rightarrow t = 8\text{ s}$$

: متحرکی در مسیر مستقیم و با شتاب ثابت فاصله 80 m متری از A تا B را در مدت ۸ ثانیه طی می‌کند و در لحظه رسیدن به نقطه B سرعتش به 15 m/s می‌رسد. شتاب متحرک چند متر بر مربع ثانیه است؟
(ریاضی ۱۹)

$$\frac{5}{4} \quad (4)$$

$$\frac{5}{2} \quad (3)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

: نقطه A را مبدأ مکان و زمان فرض می‌کنیم. معادله‌های $x - t$ و $v - t$ در حرکت با شتاب ثابت را برای نقطه B می‌نویسیم:

$$\begin{cases} \Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \\ v = at + v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 80 = \frac{1}{2}a(\lambda)^2 + v_0(\lambda) \\ 15 = a(\lambda) + v_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 80 = 32a + \lambda v_0 \\ (15 = \lambda a + v_0) \times \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 80 = 32a + \lambda v_0 \\ 120 = 64a + \lambda v_0 \end{cases}$$

$$40 = 32a \Rightarrow a = \frac{40}{32} = \frac{5}{4} \text{ m/s}^2$$

: دو متحرک A و B از یک نقطه بدون سرعت اولیه در یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می‌کنند. اگر شتاب متحرک A، 4 m/s^2 برابر شتاب متحرک B باشد، در یک جابه‌جایی مساوی سرعت متوسط متحرک A چند برابر سرعت متوسط متحرک B است؟
(ریاضی فارج ۹۴)

$$4 \quad (4)$$

$$\sqrt{2} \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

گزینه ۲ روش اول: با استفاده از رابطه مستقل از زمان، سرعت نهایی دو متحرک را

در جایه جایی دلخواه Δx به دست می آوریم:

$$\begin{cases} v_A - 0 = 2a_A \Delta x \\ v_B - 0 = 2a_B \Delta x \end{cases} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \left(\frac{v_A}{v_B}\right)^2 = \frac{a_A}{a_B} = 4 \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = 2$$

حالا با توجه به این که سرعت اولیه دو متحرک، صفر و شتاب حرکت آنها ثابت بوده، سرعت

متوسط آنها را حساب می کنیم:

$$\frac{v_{av_A}}{v_{av_B}} = \frac{\frac{v_A + 0}{2}}{\frac{v_B + 0}{2}} = \frac{v_A}{v_B} = 2$$

روش دوم: از رابطه $v = at + v_0$ استفاده می کنیم و نسبت زمان حرکت دو

متحرک را به دست می آوریم:

$$\begin{cases} \Delta x = \frac{1}{2} a_A (\Delta t)_A^2 \\ \Delta x = \frac{1}{2} a_B (\Delta t)_B^2 \end{cases} \Rightarrow 1 = \frac{a_A (\Delta t)_A^2}{a_B (\Delta t)_B^2} \Rightarrow 1 = 4 \times \left(\frac{\Delta t_A}{\Delta t_B}\right)^2 \Rightarrow \frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = \frac{1}{2}$$

حالا می توانیم نسبت سرعت های متوسط A و B را به دست آوریم:


$$\frac{v_{av_A}}{v_{av_B}} = \frac{\frac{\Delta x}{\Delta t_A}}{\frac{\Delta x}{\Delta t_B}} = \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} = 2$$

جایه جایی در ثانیه n^{ام}- جایه جایی در n^{ام} ثانیه

ثانیه n^{ام} حرکت: یک بازه زمانی به طول یک ثانیه است. $(\Delta t_n = t_n - t_{n-1})$

ثانیه سوم حرکت

نمونه در نمودار مقابل، ثانیه سوم حرکت را نشان داده ایم:



ثانیه ۳ حرکت: اگر با چنین چیزی روبه رو شدید، t را در n ضرب کنید و سپس t ثانیه از آن کم

کنید. بازه زمانی موردنظر از لحظه $-nt$ ثانیه تا لحظه nt ثانیه است.

مثالاً اگر گفته شد ۲ ثانیه پنجم، ۲ را در ۵ ضرب کرده و ۲ ثانیه از آن کم می کنیم تا لحظه اول بازه

به دست آید ($2 \times 5 - 2 = 8$)، بازه موردنظر می شود: از ۱۰ s تا ۸ s.

جایه جایی متحرک در ثانیه n^{ام} حرکت: $\Delta x_n = \frac{1}{2} a(2n - 1) + v_0 = (n - 0 / \Delta) a + v_0$

جایه جایی متحرک در t ثانیه n^{ام} حرکت: $\Delta x_{t,n} = \frac{1}{2} a t^2 (2n - 1) + v_0 t = (n - 0 / \Delta) a t^2 + v_0 t$

اگر در یک حرکت با شتاب ثابت a ، متحرکی در یک ثانیه Δx متر جایه جا شود، در ثانیه بعدی $\Delta x + a$ متر جایه جا می شود.



جایه جایی در t ثانیه‌ایم
جایه جایی در t ثانیه‌ایم

$$at^2 = \frac{\Delta x_{t,n} - \Delta x_{t,m}}{n - m}$$

متحرکی در یک مسیر مستقیم و از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. اگر مسافت طی شده در ثانیه اول 4 متر باشد، مسافت طی شده در ثانیه سوم چند متر است؟

۲۰ (۴)

۱۶ (۳)

۱۲ (۲)

۸ (۱)

$$\Delta x_1 = (1 - 0 / 5)a + 0 \Rightarrow 4 = 0 / 5a \Rightarrow a = \frac{4}{0 / 5} = 8 \text{ m/s}^2 \quad \text{گزینه ۴}$$

$$\Delta x_3 = (3 - 0 / 5)a + 0 \Rightarrow \Delta x_3 = 2 / 5 \times 8 = 20 \text{ m}$$

نمودارهای حرکت باشتاب ثابت


نمودارهای $x - t$, $v - t$, $a - t$ و $v - t$ مربوط به حرکت باشتاب ثابت را در جدول زیر ببینید:

مکان - زمان	سرعت - زمان	شتاب - زمان	ویژگی
			$v_0 = 0$ و $a > 0$
			$v_0 > 0$ و $a > 0$
			$v_0 < 0$ و $a > 0$
			$v_0 = 0$ و $a < 0$

مکان - زمان	سرعت - زمان	شتاب - زمان	ویژگی
			$v_0 > 0 \text{ و } a < 0$
			$v_0 < 0 \text{ و } a < 0$

معادله مکان - زمان حرکت با شتاب ثابت، معادله درجه دوم است و نمودار آن یک سهمی است. معادله این سهمی در حالت کلی به شکل $x = At^2 + Bt + C$ است.

از این معادله و نمودار مربوط به آن می توانیم اطلاعات زیر را به دست آوریم:



• سهمی نسبت به زمان $t = -\frac{B}{2A}$ متقاضن است. بعضی از تست ها را می توان با توجه به همین تقارن حل نمود.

• اگر جهت تغیر سهمی رو به بالا باشد (↑)، شتاب مثبت ($a > 0$) و اگر جهت تغیر سهمی رو به پایین باشد (↓)، شتاب منفی ($a < 0$) است.


• شیب مماس بر نمودار مکان - زمان در هر لحظه، سرعت در آن لحظه را به دست می دهد. اگر اندازه شیب مماس بر این نمودار در حال کاهش باشد، حرکت کندشونده و اگر اندازه شیب در حال افزایش باشد حرکت تقدشونده است.

• اگر در لحظه $t = 0$ شیب مماس بر نمودار مکان - زمان مثبت باشد (↗) سرعت اولیه مثبت، اگر شیب مماس منفی باشد (↖) سرعت اولیه منفی و اگر شیب مماس صفر باشد (↔) سرعت اولیه صفر است.

• نمودار $v - t$ حرکت شتاب ثابت یک خط است. شیب خط برابر با شتاب حرکت و عرض از مبدأ آن برابر سرعت اولیه است.



توصیه: رسم نمودارهای مختلف یک حرکت از روی یکدیگر را تمرین کنید. برخی از تست‌ها با این شکرده به راحتی حل می‌شوند.



نمودار مکان – زمان متوجه کی مطابق شکل مقابل به صورت سهمی است. در بازه زمانی صفر تا ۸ بزرگی شتاب متوسط (ریاضی ۹۷)

و سرعت متوسط در SI، کدام است؟

۱) و صفر

۲) ۲ و صفر

۳) ۲ و ۲

۴) ۱ و ۱

کام اول سرعت متوسط: مکان متوجه در صفر و ۸ یکسان است.

«گزینه ۱» =

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{16 - 16}{8 - 0} = 0 \Rightarrow \text{حذف ۳ و ۴}$$

گام دوم شتاب: معادله کلی سهمی را نوشته و ضرایب آن را با کمک نمودار به دست می‌آوریم:


$$x = At^2 + Bt + C \xrightarrow{t=0} 16 = A(0) + B(0) + C \Rightarrow C = 16$$

$\xrightarrow{t=4} 24 = A(16) + B(4) + 16$ به دلیل تقارن، نقطه رأس سهمی در ۴ است.

$$\xrightarrow{t=4} 2 = 4A + B \quad (1)$$

$$\xrightarrow{t=8} 16 = A(64) + B(8) + 16 \xrightarrow{t=8} 0 = 8A + B \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow A = -\frac{1}{2} = \frac{a}{2} \Rightarrow a = -1 \text{ m/s}^2$$



نمودار سرعت – زمان دو متوجه A و B که روی محور X حرکت می‌کنند، مطابق شکل مقابل است. در مدتی که متوجه A در جهت محور X حرکت کرده است، بزرگی جابه‌جاوی متوجه B، چند متر است؟ (ریاضی ۹۵)

۱) ۱۸۶ ۲) ۱۹۲ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۲۸

کام اول تا وقتی سرعت متوجه A ثابت (بالای محور t) است، یعنی در جهت محور X حرکت می‌کند. لحظه صفرشدن سرعت، پایان حرکت در جهت محور X است.


معادله $v - t$ را برای متوجه A نوشته و زمان صفرشدن سرعت را به دست می‌آوریم:

$$A = a_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-8 - 16}{18} = \frac{-24}{18} = -\frac{4}{3} \text{ m/s}$$

$$v_A = a_A t + v_{0A} \Rightarrow 0 = -\frac{4}{3}t + 16 \Rightarrow t = 12 \text{ s}$$

$$B = a_B = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-8 - (-2)}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \text{ m/s}$$

$$t = 12 \text{ s} \text{ در } v_B = a_B t + v_{0B} \Rightarrow v_B = \frac{2}{3} \times 12 - 2 = -12 \text{ m/s}$$




روش اول: سطح محصور بین نمودار سرعت B و محور t تا لحظه $t = 12\text{s}$ برابر جایه‌جایی خواسته شده است:

$$\text{مساحت ذوزنقه رنگ شده} \\ S = |\Delta x_B| \\ = \frac{(20 + 12) \times 12}{2} = 192\text{ m}$$

روش دوم: از رابطه مستقل از شتاب داریم:

$$\Delta x_B = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t = \frac{-20 + (-12)}{2} \times 12 = -192\text{ m} \Rightarrow |\Delta x_B| = 192\text{ m}$$




نمودار شتاب - زمان متحركی که سرعتش در مبدأ زمان

+5 m/s است، به شکل مقابل می‌باشد، سرعت متوسط متحرك

در این 12 ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟ (ریاضی ۹۳ - مشابه تمثیل قریب)

$$13/5(1) \quad 14(2) \quad 28(4) \quad 27(3)$$



روش اول: از روی نمودار $a - t$ داده شده،

نمودار $v - t$ را رسم می‌کنیم:

$$v = at + v_0 \Rightarrow \begin{cases} \text{معادله خط (۱): } v = 4t + 5 \\ \Rightarrow (t = 10\text{s}): v = 4(10) + 5 = 45\text{ m/s} \\ \text{معادله خط (۲): } v = -2(t - 10) + 45 \\ \Rightarrow (t = 12\text{s}): v = -2(12 - 10) + 45 = 41\text{ m/s} \end{cases}$$

سطح زیر نمودار که از دو ذوزنقه تشکیل شده، برابر با جایه‌جایی متحرك در مدت 12 s است.

$$\Delta x = S_1 + S_2 = \frac{(5 + 45) \times 10}{2} + \frac{(45 + 41) \times 2}{2} = 250 + 86 = 336\text{ m}$$

$$\Rightarrow v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{336}{12} = 28\text{ m/s}$$

روش دوم: با استفاده از معادلات $x - t$ و $v - t$ در حرکت با شتاب ثابت، مجموع جایه‌جایی‌های

$$\Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \Rightarrow \Delta x_1 = \frac{1}{2}(4)(10)^2 + 5 \times 10 = 250\text{ m}$$

$$v = at + v_0 \Rightarrow 10\text{s}: v = 4(10) + 5 = 45\text{ m/s}$$

$$\Delta x_2 = \frac{1}{2}(-2)(12 - 10)^2 + 45(12 - 10) = 86\text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta x_{کل} = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 250 + 86 = 336\text{ m}$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x_{کل}}{\Delta t} = \frac{336}{12} = 28\text{ m/s}$$



نمودار شتاب-زمان متاخرکی که از حال سکون روی محور x ها حرکت می کند، مطابق شکل

زیر است. در بازه زمانی $t_1 = 20\text{ s}$ تا $t_2 = 35\text{ s}$ ، کدام مورد درست است؟ (تمرس)

(۱) حرکت تندشونده است.


(۲) حرکت کندشونده است.

(۳) جهت حرکت یک بار تغییر می کند.

(۴) متاخرک در جهت محور x ها حرکت می کند.

گوینده ۳ «چون تمام گزینه های داده شده به نحوی به سرعت و جهت آن مربوط می شوند،

بهترین کار آن است که با توجه به نمودار $a - t$ داده شده، نمودار $v - t$ حرکت را رسم کنیم:



همان طور که از روی شکل پیدا است، در بازه

$t_1 = 20\text{ s}$ تا $t_2 = 35\text{ s}$ ، حرکت ابتدا کندشونده

و سپس تندشونده است. (حذف ۱ و ۲).

متاخرک یک بار در لحظه $t = 30\text{ s}$ تغییر جهت

می دهد (درست بودن ۳) و تا قبل از تغییر جهت،

در خلاف جهت محور x حرکت می کند. (حذف ۴).

فرمول های فصل

• الگای حرکت در راستای خط راست

تندی متوسط:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t}$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

سرعت متوسط:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

شتاب متوسط:

حرکت تندشونده $\Leftrightarrow v > 0$

• تندشونده، کندشونده

حرکت کندشونده $\Leftrightarrow v < 0$

$$x = vt + x_0$$

• حرکت با سرعت ثابت

معادله حرکت با سرعت ثابت:

$$\text{km/h} \xleftrightarrow{x^3/6} \text{m/s}$$

تبديل یکاهای سرعت:

• معادلات حرکت با شتاب ثابت

معادله سرعت - زمان:

$$v = at + v_0$$

معادله مکان - زمان:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$$

معادله مستقل از زمان:

$$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2}$$

معادله سرعت متوسط:

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t$$

معادله مستقل از شتاب:

• جابه‌جایی در ثانیه $n^{\text{ام}} - t$ ثانیه $n^{\text{ام}}$

$$\Delta x_n = (n - 0 / 5) a + v_0$$

$$\Delta x_{t,n} = (n - 0 / 5) at^r + v_0 t$$

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۲۰۵- پرنده‌ای که روی لبه ساختمان بلندی به ارتفاع ۵۰ متر نشسته بود، ابتدا پرواز کرده و به پای ساختمان می‌رسد، سپس ۴۰ متر به سمت مشرق حرکت می‌کند و در نهایت ۳۰ متر به سمت شمال می‌رود. جابه‌جایی کل این پرنده چند متر است؟

(ریاضی فارج ۹۷)

۴۰\sqrt{2}

۵۰\sqrt{3}

۵۰\sqrt{2}

۱۲۰

۲۰۶- بردار سرعت متحركی که در صفحه حرکت می‌کند، در مدت ۵ ثانیه، از $\bar{v}_1 = 2\bar{i} - 5\bar{j}$ به $\bar{v}_2 = 17\bar{i} + 10\bar{j}$ می‌رسد (در SI). بزرگی شتاب متوسط در این مدت چند متر بر مربع ثانیه است؟

(ریاضی ۹۴)






۵

۳

۵\sqrt{2}

۳\sqrt{2}

۲۰۷- اتومبیلی که از قسمت منفی محور x در حال حرکت به سمت مبدأ بوده، ترمز می‌گیرد. کدام نمودار می‌تواند مربوط به حرکت این اتومبیل باشد؟



۲۰۸- نمودار سرعت - زمان متحركی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. در بازه زمانی بین t_1 و t_2 ، حرکت متحرك شونده و در محور x است.


(تجزی ۱۶)

(۲) تند - جهت

(۴) تند - خلاف جهت

(۱) کند - جهت


(۳) کند - خلاف جهت




- ۲۰۹- نمودار مکان - زمان متخرکی در SI مطابق شکل رو به رو است.
سرعت متوسط این متخرک در بازه زمانی t_1 تا t_2 کدام است؟
- +۵ (۱)
-۵ (۴) $\frac{+۲ / ۵}{-۲ / ۵}$ (۳)

- ۲۱۰- نمودار سرعت - زمان متخرکی که در مسیری مستقیم در حرکت است، به صورت شکل زیر است.
اگر سرعت متوسط متخرک در این ۸ s برابر 25 m/s باشد، بیشینه سرعت متخرک در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟


- (تهریه ۹۸) $\frac{۲۰ (۱)}{۲۵ (۲)}$
 $\frac{۴۰ (۳)}{۵۰ (۴)}$



- ۲۱۱- شکل مقابل، نمودار مکان - زمان متخرکی است
که در مسیر مستقیم حرکت کرده است. بیشینه سرعت
آن چند متر بر ثانیه است؟
- (تهریه ۹۵) $\frac{۳ (۱)}{۵ (۲)}$
 $\frac{۷ (۳)}{۹ (۴)}$




- ۲۱۲- شکل رو به رو، نمودار سرعت - زمان متخرکی است که
روی محور x حرکت می کند. مسافتی که متخرک در ۵ ثانیه
اول پیموده است، چند متر است؟
- (ریاضی فارج ۹۸ - مشابه ریاضی) $\frac{۱۰ (۱)}{۲۱ (۲)}$
 $\frac{۲۵ (۳)}{۲۹ (۴)}$



- ۲۱۳- نمودار سرعت - زمان متخرکی که روی مسیر مستقیم
حرکت می کند، مطابق شکل داده شده است. سرعت متوسط
این متخرک در بازه $t_1 = 5 \text{ s}$ تا $t_2 = 15 \text{ s}$ چند برابر
سرعت متوسط آن در بازه $t_3 = 20 \text{ s}$ تا $t_4 = 45 \text{ s}$ است؟
- $\frac{۱}{۳} (۱)$
 $\frac{-۱}{۷} (۴) \frac{\frac{۱}{۳}}{\frac{-۱}{۷}}$ (۳)

۲۱۴- متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکت درمی آید و نمودار شتاب - زمان آن مطابق شکل است. در کدام لحظه (برحسب ثانیه)، جهت سرعت عوض می شود؟



(تبری گارج ۱۹)

- ۲ (۱)
۴ (۲)
۶ (۳)
۸ (۴)


۲۱۵- معادله های سرعت و شتاب متحرکی در SI به صورت $s = 6t^2 - 4t + 2$ و $v = 12t - 4$ است. در کدام یک از لحظات زیر (برحسب ثانیه) اندازه سرعت متحرک در حال کاهش است؟ (ریاضی گارج ۹۲ با تغییر)

- ۰ / ۴ (۲)
۰ / ۴ (۱)
۱ / ۵ (۴)
۰ / ۵ (۳)

۲۱۶- دوچرخه سواری فاصله ۹۰ کیلومتری مستقیم بین دو شهر را در مدت $\frac{4}{5}$ ساعت می پیماید. وی با سرعت ثابت ۲۴ کیلومتر بر ساعت رکاب می زند؛ اما برای رفع خستگی، توقف هایی هم دارد. مدت کل (کلکور قدیمی)

- ۴۵ (۲)
۳۰ (۴)

توقف او چند دقیقه است؟



۲۱۷- نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B که با سرعت ثابت حرکت می کنند مطابق شکل رویه رو است. چند ثانیه پس از شروع حرکت، این دو متحرک به هم می رساند؟

- ۴۵ (۱)
۵۰ (۲)
۵۵ (۳)

(۴) دو متحرک هیچ گاه به هم نمی رسانند.

۲۱۸- متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدأ زمان از مبدأ مکان روی محور x با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظه $s = 5$ به مکان $x = -\frac{122}{5} m$ رسید. بزرگی سرعت متحرک در این لحظه به چند متر بر ثانیه می رسد؟

(ریاضی ۹۱)

- ۴۹ / ۰ (۴) ۴۵ / ۰ (۳) ۳۲ / ۴ (۲) ۱۹ / ۶ (۱)

۲۱۹- اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت $h = 108 km/h$ در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصله $165 m$ ، با شتاب ثابت $\frac{3}{s} m/s^2$ ترمز می کند و درست جلوی مانع می ایستد. اگر زمان واکنش

راننده t_1 و زمانی که حرکت اتومبیل کندشونده بوده، t_2 باشد، $\frac{t_2}{t_1}$ کدام است؟

(ریاضی ۹۶)

- ۲۰ (۴) ۱۵ (۳) ۱۰ (۲) ۵ (۱)

-۲۲۰- متحرکی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت s^2 / m به حرکت درمی‌آید و پس از مدتی حرکتش یکنواخت می‌شود و در نهایت با شتاب s^2 / m حرکتش کند شده و می‌ایستد. اگر کل زمان حرکت ۲۵ ثانیه و سرعت متوسط در این مدت m / s باشد، زمانی که حرکت متحرک یکنواخت بوده است، چند ثانیه است؟ (تمریق ۹۷)

- ۲۰) ۴ ۱۵) ۳ ۱۰) ۲ ۵) ۱

-۲۲۱- معادله مکان-زمان متحرکی در SI به صورت $s = 2t^2 + 4t - 8$ است. در فاصله زمانی $t_1 = 0$ تا $t_2 = 2$ s، مسافتی که متحرک طی می‌کند، چند برابر اندازه جابه‌جایی آن است؟ (ریاضی فارج ۹۸)

- ۲) ۴ ۱/۶) ۳ ۱/۵) ۲ ۱) ۱

-۲۲۲- قطار A به طول ۲۰۰ متر با سرعت ثابت m / s در حال حرکت است. قطار B به طول ۴۰ m ثابت که روی ریل مجاور توقف کرده است، به محفوظ این که قطار A کاملاً از آن عبور کرد، با شتاب s^2 / m در همان جهت حرکت قطار A شروع به حرکت می‌کند و سرعت خود را به m / s می‌رساند و با همان سرعت، حرکت خود را ادامه می‌دهد. قطار B چند ثانیه پس از شروع حرکت، از قطار A سبقت گرفته و از کنار آن کاملاً عبور می‌کند؟ (ریاضی ۹۲)

- ۱۰) ۴ ۸۰) ۳ ۸۲/۵) ۲ ۵۷/۵) ۱


-۲۲۳- مطابق شکل زیر، متحرکی با شتاب ثابت s^2 / m روی محور x حرکت می‌کند. اگر فاصله بین دو نقطه A و B را در مدت ۸ s طی کند و در نقطه O سرعتی صفر باشد، فاصله OA چند متر است؟ (تمریق ۹۸ - مشابه ریاضی فارج ۱۹)




-۲۲۴- متحرکی با شتاب ثابت و سرعت اولیه v_0 در ۲ ثانیه اول حرکت خود، ۱۳ متر، و در ۲ ثانیه سوم حرکت خود، ۲۵ متر را طی می‌کند. شتاب حرکت در SI کدام است؟ (تمریق ۹۹)

- ۵) ۴ ۳) ۳ ۲/۵) ۲ ۱) ۱

-۲۲۵- نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر به صورت سه‌می است. چند ثانیه پس از لحظه $t = 0$ بزرگی سرعت متحرک برابر بزرگی سرعت اولیه می‌شود؟




-۲۲۶ نمودار مکان- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل، به صورت سه‌می است. اگر مسافت طی شده توسط متوجه در بازه زمانی $t = 3\text{ s}$ تا $t = 9\text{ s}$ برابر 12 m باشد، جایه‌جایی متوجه در این بازه چند متر است؟
(ریاضی ۹۳)




- (۱) صفر
(۲) 3 m
(۳) 6 m
(۴) 12 m

-۲۲۷ مطابق شکل مقابل، نمودار مکان- زمان متوجهی به صورت سه‌می است. سرعت متوجه در لحظه $t = 8\text{ s}$ $t = 8\text{ s}$ چند متر بر ثانیه است؟
(ریاضی ۹۱)



- (۱) 3 m/s
(۲) 4 m/s
(۳) 6 m/s
(۴) 12 m/s

-۲۲۸ مطابق شکل روبرو، نمودار مکان- زمان متوجهی به صورت یک سه‌می است. شتاب حرکت چند متر بر مجدور ثانیه است؟
(ریاضی فارج ۹۱)



- (۱) 3 m/s^2
(۲) 1 m/s^2
(۳) -1 m/s^2
(۴) -3 m/s^2

-۲۲۹ متوجهی روی محور x حرکت می کند و معادله مکان- زمان آن در SI به صورت $x = -2t^2 + 12t - 40$ می باشد. مسافتی که این متوجه در بازه زمانی صفر تا $t = 5\text{ s}$ طی می کند، چند متر است؟
(ریاضی فارج ۹۳)

- ۲۶ (۴) ۲۴ (۳) ۱۵ (۲) ۱۰ (۱)


-۲۳۰ معادله سرعت- زمان متوجهی که بر یک مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت $v = -4t - 4$ است. این متوجه در لحظه $t = 0$ از مکان $x = -3\text{ m}$ عبور می کند. معادله مکان- زمان متوجه کدام است؟

- ۲۴ (۴) -۴ (۳) -۴ (۲) -۲ (۱)

-۲۳۱ متوجهی روی محور x با شتاب ثابت در حرکت است و در مبدأ زمان با سرعت $v = +3\text{ m/s}$ از مکان $x = +4\text{ m}$ می گذرد. اگر متوجه در لحظه $t = 4\text{ s}$ در جهت مثبت محور x ها در بیشترین فاصله خود از مبدأ باشد، در لحظه $t = 8\text{ s}$ در چند متری مبدأ خواهد بود؟
(ریاضی فارج ۹۰)

- ۱۲ (۴) ۸ (۳) ۶ (۲) ۴ (۱)

۱۹۵




۲۳۲- نمودار سرعت- زمان متحركی که روی محور x ها حرکت می کند، مطابق شکل رویه رو است. بزرگی جایه جایی متحرك در فاصله زمانی $t = 12\text{ s}$ تا $t = 6\text{ s}$ چند متر است؟ (تهری ۹۳)

۱۲ (۱)

۱۸ (۲)

۲۲ / ۵ (۳)

۳۲ / ۵ (۴)




۲۳۳- نمودار سرعت- زمان دو قطار A و B که روی یک ریل مستقیم به طرف هم حرکت می کنند، مطابق شکل مقابل است. در لحظه $t = 0$ فاصله قطارها از هم 500 m است. لحظه ای که قطار A می ایستد، قطار B در چه فاصله ای از آن قرار دارد؟ (تهری فارج ۹۷)

۲۵ (۱)

۷۵ (۲)

۱۰۰ (۳)

۱۲۵ (۴)




۲۳۴- نمودار شتاب - مکان متحركی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اگر متحرك در لحظه $t = 0$ از مبدأ با سرعت 10 m/s عبور کند، سرعت آن در مکان $x = 61\text{ m}$ چند متر بر ثانیه است؟ (تهری ۹۷)

۱۲ (۲)

۲۲ (۱)

۶ (۴)

۸ (۳)



۲۳۵- نمودار شتاب - زمان متحركی که در مبدأ زمان با سرعت 4 m/s بر ثانیه از مبدأ مکان می گذرد، مطابق شکل است. مسافت طی شده در بازه زمانی صفر تا 12 ثانیه، چند متر است؟ (تهری فارج ۹۷)


۹۶ (۲)

۴۸ (۱)

۱۶۰ (۴)

۱۲۸ (۳)


پاسخ نامه تشریحی



$$x = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ m} \Rightarrow d = \sqrt{50^2 + 50^2} = 50\sqrt{2} \text{ m}$$

$$\bar{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{(17\vec{i} + 10\vec{j}) - (2\vec{i} - 5\vec{j})}{5} = \frac{(15\vec{i} + 15\vec{j})}{5}$$


$$\Rightarrow \bar{a}_{av} = 3\vec{i} + 3\vec{j} \Rightarrow |a_{av}| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2} \text{ m/s}^2$$



در نمودار $t - v$ هر وقت نمودار به محور t نزدیک شود، یعنی اندازه سرعت در حال کم شدن است. در بازه t_1 تا t_2 نمودار به محور t نزدیک شده و حرکت کندشونده است. چون این قسمت از نمودار، بالای محور t قرار دارد، پس در این بازه سرعت مثبت است و متحرک در جهت محور X حرکت می‌کند.

سرعت متوسط در بازه t_1 تا t_2 برابر شیب خط واصل دو نقطه متناظر این زمان‌ها در نمودار است. این خط (خط‌چین)، امتداد خطی است که از $t = 2 \text{ s}$ شروع می‌شود؛ پس اگر شیب خط‌چین را در بازه 2 s تا 4 s پیدا کنیم، سرعت متوسط در بازه t_1 تا t_2 را پیدا کردایم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 - 0}{4 - 2} = +5 \text{ m/s}$$



$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow 10 = \frac{25}{2} \frac{v_{max}}{(25 - 0)} \Rightarrow v_{max} = 20 \text{ m/s}$$

تکنیک در نمودارهای این شکلی (مثلثی) همیشه سرعت متوسط برابر نصف سرعت پیشینه است.

۲۰۵- گزینه «۲»

شكل مقابل است. ابتدا مسیرهای (۲) و (۳) را در نظر گرفته و با قضیه فیثاغورس، x را حساب می‌کنیم. بعد همین کار را برای X و مسیر (۱) انجام می‌دهیم تا طول \bar{d} به دست آید.

۲۰۶- گزینه «۱»

۲۰۷- گزینه «۴»

اتومبیل در قسمت منفی محور X حرکت می‌کند

(حذف ۱ و ۲). هنگامی که اتمبیل ترمز می‌گیرد، تنیدی آن (شیب مماس بر نمودار $x - t$) کاهش می‌یابد. در ۳ شیب مماس در حال کاهش است.

۲۰۸- گزینه «۱»

در نمودار $t - v$ هر وقت نمودار به محور t نزدیک شود، یعنی اندازه سرعت در حال کم شدن است. در بازه t_1 تا t_2 نمودار به محور t نزدیک شده و حرکت کندشونده است. چون این قسمت از نمودار، بالای محور t قرار دارد، پس در این بازه سرعت مثبت است و متحرک در

۲۰۹- گزینه «۲»


زمان‌ها در نمودار است. این خط (خط‌چین)، امتداد خطی است که از $t = 2 \text{ s}$ شروع می‌شود؛ پس اگر شیب خط‌چین را در بازه 2 s تا 4 s پیدا کنیم، سرعت متوسط در بازه t_1 تا t_2 را پیدا کردایم:

۲۱۰- گزینه «۱»

می‌دانیم که جایه‌جایی متحرک برابر سطح زیر نمودار $t - v$ است. پس برای نمودار رو به رو داریم:

$$\Delta x = S = \frac{v_{max} \times 25}{2} = \frac{25}{2} v_{max}$$

هم‌چنین طبق فرمول سرعت متوسط ($v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$) داریم:




شیب مماس بر نمودار، از ابتدای

حرکت تا نقطه A افزایش می‌یابد (حرکت تندشونده). از نقطه A تا B شیب ثابت است (سرعت ثابت) و از نقطه B به تدریج کاهش می‌یابد (حرکت کندشونده). بنابراین، بیشترین سرعت متحرك بین A تا B بوده و شیب پاره‌خط AB بیشینه سرعت متحرك است:

$$v_{AB} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A} = \frac{54 - 12}{16 - 10} = 7 \text{ m/s}$$


هر یک از خانه‌های محور X معادل ۶ m و هر یک از خانه‌های محور t معادل ۲ s است.



در نمودار روبرو، مسافت طی شده توسط متحرك در ۵ ثانية اول برابر با سطح زیر نمودار در این بازه زمانی است. پس ابتدا باید اندازه' ۷ را پیدا کنیم و بعد مساحت S را محاسبه نماییم:

$$|\frac{v'}{v}| = \frac{5}{3} \Rightarrow |v'| = 10 \text{ m/s}$$

$$|\Delta x(0,5)| = S = \frac{5 \times 10}{2} = 25 \text{ m}$$



سطح زیر نمودار t - v برابر جایه‌جایی است. سطح زیر نمودار را در بازه‌های داده شده به دست می‌آوریم:

$$(15 - 5) \times 20 \text{ m} \quad \text{بازه } 5 \text{ s} \text{ تا } 15 \text{ s}: S_1 = \frac{(15 - 5) \times 20}{2} = 100$$

$$\Rightarrow v_{av_1} = \frac{S_1}{\Delta t} = \frac{100}{10} = 10 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} (45 - 35) \times (-10) \\ (35 - 20) \times (-10) \\ (20 - 5) \times 10 \\ (5 - 0) \times 20 \end{aligned} \quad \text{بازه } 35 \text{ s} \text{ تا } 45 \text{ s}: S_2 + S_3 = [(30 - 20) \times (-10)] + [(\frac{(35 - 30) \times (-10)}{2})] + [(\frac{(45 - 35) \times 10}{2})] = -100 - 25 + 50 = -75$$

$$\Rightarrow v_{av_2} = \frac{S_2 + S_3}{\Delta t} = \frac{-75}{40} = -1.875 \text{ m/s} \Rightarrow \frac{v_{av_1}}{v_{av_2}} = \frac{10}{-1.875} = \frac{10}{-3}$$

مطلوب نمودار، شتاب ثابت منفی باعث می‌شود که متحرك به سمت X های منفی سرعت گرفته و سرعتش افزایش یابد. با مشیت شدن شتاب، سرعت متحرك کاهش می‌یابد تا سرعت صفرشده و پس از آن، جهت سرعت به سمت مثبت تغییر کند.

لحظه‌های تغییر جهت سرعت، لحظه‌ای است که سرعت صفر می‌شود. برای پیدا کردن این لحظه باید بینیم در کدام لحظه، اندازه Δv_1 (تغییر سرعت در حرکت تندشونده) با اندازه Δv_2 (تغییر سرعت در حرکت کندشونده) برابر می‌شوند.

سطح زیر نمودار $a - t$ برابر است با Δv . بنابراین:

$$|\Delta v_1| = |\Delta v_2| \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |\Delta v_1| = |-2 \times 2| = 4 \text{ m/s} \\ |\Delta v_2| = |1 \times (t-2)| = 4 \text{ m/s} \end{array} \right. \Rightarrow t-2=4 \Rightarrow t=6 \text{ s}$$

اندازه سرعت متحرک در حرکت کندشونده در حال کاهش است. شرط

کندشونده بودن حرکت این است که $a < 0$; پس باید معادله های v و a را تعیین علامت کنیم:

$$\text{معادله } v \text{ ریشه ندارد؛ چون } 0 = B^3 - 4AC = 16 - 48 = -32.$$

این معادله همواره مثبت است. در نتیجه حرکت وقتی کندشونده است که a منفی باشد.

t	$t < \frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$t > \frac{1}{3}$
a	-	+	+

به ازای t های کوچک تر از $\frac{1}{3}$ ، حرکت کندشونده است. در بین گزینه های داده شده فقط ۱ از s کوچک تر است.

در گام اول، محاسبه می کنیم که اگر دوچرخه سوار بدون توقف رکاب می زد،

چند ساعت طول می کشید تا به مقصد برسد:

$$\Delta x = v \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{90 \text{ km}}{24 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 3.75 \text{ h}$$

اختلاف این زمان با زمانی که دوچرخه سوار در راه بوده، زمان توقف او را مشخص می کند
 $\Delta t' = 4/5 - 3/75 = 0/75 \text{ h} = 0/75 \times 60 \text{ min} = 45 \text{ min}$

گام اول شب نمودار $x - t$ (سرعت) را برای A و B به دست می آوریم:

$$v_A = \frac{\Delta x_A}{\Delta t} = \frac{400 - 100}{20} = 15 \text{ m/s}, \quad v_B = \frac{\Delta x_B}{\Delta t} = \frac{0 - (-350)}{14} = 25 \text{ m/s}$$

گام دوم معادله مکان - زمان دو متحرک را می نویسیم و آنها را مساوی قرار می دهیم. با محاسبه t در این حالت، زمان تلاقی دو متحرک به دست می آید:

$$x = vt + x_0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_A = 15t + 100 \\ x_B = 25t - 350 \end{array} \right\} \Rightarrow 15t + 100 = 25t - 350 \Rightarrow 10t = 450 \Rightarrow t = 45 \text{ s}$$

در این حرکت شتاب ثابت که متحرک در لحظه $t = 0$ در مکان $x_0 = 0$ بوده

است، سرعت اولیه، زمان حرکت و جابه جایی را داریم و بزرگی سرعت نهایی را می خواهیم؛ پس از آن جایی که شتاب نه داده و نه خواسته شده است، از رابطه مستقل از شتاب به جواب می رسیم:

$$\frac{v_0 + v}{2} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \frac{0 + v}{2} = \frac{-122/5 - 0}{5 - 0} \Rightarrow v = -49 \text{ m/s} \Rightarrow |v| = 49 \text{ m/s}$$

۲۱۹- گزینه «۴»

راننده در مدت t_1 (زمان واکنش راننده نسبت به مانع)، مسافت x_1 را با سرعت ثابت 30 m/s طی کرده است، سپس در مدت زمان t_2 مسافت x_2 را با شتاب ثابت -3 m/s^2 طی کرده تا سرعت نهایی اتومبیل به صفر برسد. کل مسافتی که اتومبیل طی کرده برابر $x = x_1 + x_2 = 165 \text{ m}$ است، حال با توجه به نوع حرکت اتومبیل در هر مرحله می‌توان نوشت:

حرکت در مرحله دوم:

$$\left\{ \begin{array}{l} v = at + v_0 \xrightarrow[a = -3 \text{ m/s}^2 \text{ و } t = t_2]{v_0 = 30 \text{ m/s}} = -3 \times t_2 + 30 \Rightarrow t_2 = 10 \text{ s} \\ \Delta x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t \xrightarrow[a = -3 \text{ m/s}^2 \text{ و } \Delta x = x_2]{t_2 = 10 \text{ s} \text{ و } v_0 = 30 \text{ m/s}} = \frac{1}{2} \times (-3) \times 10^2 + 30 \times 10 \\ \Rightarrow x_2 = 150 \text{ m} \end{array} \right.$$


$$x = x_1 + x_2 \Rightarrow 165 = x_1 + 150 \Rightarrow x_1 = 15 \text{ m}$$

حرکت در مرحله اول:

$$\Delta x = vt \xrightarrow[v = v_0 = 30 \text{ m/s}]{\Delta x = x_1 \text{ و } t = t_1} 15 = 30 \times t_1 \Rightarrow t_1 = 0.5 \text{ s} \xrightarrow[t_2 = 10 \text{ s}]{t_1 = 0.5 \text{ s}} \frac{t_2}{t_1} = 20$$

۲۲۰- گزینه «۳»

اگر برای این تست، نمودار $v-t$ را رسم کنیم، به سادگی می‌توانیم تست را حل کنیم. مساحت زیر نمودار برابر جایه‌جایی است.



$$\bar{v} = \frac{\Delta x (=S)}{\Delta t} \Rightarrow 20 = \frac{\Delta x (=S)}{25}$$

$$\Rightarrow S = 500 \text{ m} = S_1 + S_2 + S_3 = \frac{5t^2}{2} + (25 - 2t)5t + \frac{5(25-t)^2}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 5 \text{ s} & \checkmark \\ t = 20 \text{ s} & \times \end{cases}$$

با این حساب S_2 منفی می‌شود که غیرقابل قبول است.

متاخرک به مدت $25 - 2t = 15 \text{ s}$ ثانیه حرکت یکنواخت داشته است:

۲۲۱- گزینه «۱»



چون معادله از نوع درجه ۲ است، می‌توانیم بگوییم متاخرک در لحظه

$$t' = \frac{-4}{2 \times 2} = -1 \text{ s} \quad t' = \frac{-B}{2A} \quad \text{تغییر جهت می‌دهد؛ یعنی:}$$

منفی شدن t' نشانه این است که متاخرک تغییر جهت نداده است؛ پس مسافت طی شده (ℓ) برابر اندازه جایه‌جایی ($|\Delta x|$) است و داریم:

$$\ell = |\Delta x| \Rightarrow \frac{\ell}{|\Delta x|} = 1$$

قطار B هنگامی از قطار A سبقت می‌گیرد که نقطه P از نقطه Q عبور کند. یعنی باید زمانی را پیدا کنیم که طی آن، قطار B به اندازه مجموع طول دو قطار $(225 + 200 = 425 \text{ m})$ ، بیشتر از قطار A حرکت کند.



$$\Delta x_B - \Delta x_A = S_B - S_A = 425 \text{ m} \Rightarrow S_A = 40t$$

$$S_B = \left[\frac{t + (t - 25)}{2} \right] \times 50 = 50t - 625 \Rightarrow (50t - 625) - (40t) = 425$$

$$\Rightarrow 10t - 625 = 425 \Rightarrow 10t = 1050 \Rightarrow t = 105 \text{ s}$$

این تست را می‌توان با روش‌های دیگری نیز حل کرد.

کافی است فرمول جابه‌جایی - زمان حرکت شتاب ثابت ($\Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$) **«۲- گزینه ۲»** **۲۲۳**

را یک بار برای جابه‌جایی OA و یک بار هم برای جابه‌جایی OB بنویسیم و سپس با توجه به این که فاصله AB را داریم، مسئله را حل کنیم:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \xrightarrow{\Delta x_1 = \overline{OA}, v_0 = 0} \overline{OA} = \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 = t^2$$

$$\Delta x_2 = \frac{1}{2}a(t+\lambda)^2 + v_0(t+\lambda) \xrightarrow{\Delta x_2 = \overline{OB}, v_0 = 0} \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 2 \times (t+\lambda)^2 = t^2 + 16t + 64$$

حالا با توجه به شکل رویه‌رو داریم:

$$\overline{OB} - \overline{OA} = 16 \Rightarrow (t^2 + 16t + 64) - t^2 = 16$$

$$\Rightarrow 16t + 64 = 16 \xrightarrow{\div 16} t + 4 = 1 \Rightarrow t = 6 \text{ s}$$

تست، فاصله \overline{OA} را می‌خواهد:

روش اول: متحرک در دو ثانیه اول به اندازه Δx_1 و در دو ثانیه سوم (از

$t = 6 \text{ s}$ تا $t = 4 \text{ s}$) به اندازه Δx_2 جابه‌جا شده است.

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \Rightarrow 13 = \frac{1}{2}a(2)^2 + v_0(2) \Rightarrow 13 = 2a + 2v_0 \quad (\text{I})$$

$$\Delta x_2 = x_{\text{f}} - x_{\text{i}} = \left[\frac{1}{2}a(6)^2 + v_0(6) + x_0 \right] - \left[\frac{1}{2}a(4)^2 + v_0(4) + x_0 \right]$$

$$\Rightarrow 25 = 10a + 2v_0 \quad (\text{II})$$




$$\xrightarrow{(II)-(I)} ۱۲ = \lambda a \Rightarrow a = \frac{۱۲}{\lambda} = \frac{۳}{۲} = ۱/۵ \text{ m/s}^2$$


$$at^2 = \frac{\Delta x_{t,n} - \Delta x_{t,m}}{n-m} \Rightarrow a(2)^2 = \frac{\Delta x_{2,3} - \Delta x_{2,1}}{3-1} \Rightarrow 4a = \frac{۲۵ - ۱۳}{۲} = ۶ \text{ m/s}^2$$

$$\Rightarrow a = \frac{۶}{۴} = ۱/۵ \text{ m/s}^2$$

سهمی داده شده نسبت به $t = ۴ \text{ s}$ متقارن است. بنابراین، اندازه شیب مماس بر نمودار در لحظه $t = ۰$ با اندازه شیب نمودار در لحظه $t = ۸$ برابر است. این اندازه‌ها همان بزرگی سرعت متحرک است.




با توجه به تقارن سهمی و این که سهمی داده شده نسبت به $t = ۶ \text{ s}$ متقارن است، به راحتی می‌توان فهمید که مکان متحرک در لحظه‌های ۳ s و ۹ s یکسان است. زیرا این دو نقطه نسبت به $t = ۶ \text{ s}$ متقارن هستند. از روی شکل هم پیدا است که $x_{t=۳ \text{ s}} = x_{t=۹ \text{ s}}$ و جایه‌جایی متحرک در این بازه صفر است. توضیح شکل مقابل: چون مسافت طی شده از ۳ s تا ۹ s برابر ۱۲ m بوده و حرکت متقارن است، پس متحرک از ۳ s تا ۶ s به اندازه ۶ m را طی کرده است: $۴۸ - ۶ = ۴۲ \text{ m}$.



به نمودار نگاه کنید. در لحظه ۴ s شیب نمودار مکان - زمان صفر است؛ پس در این لحظه سرعت هم برابر صفر است. به راحتی به کمک رابطه مستقل از شتاب $\frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (برای بازه زمانی $(4 \text{ s}, 8 \text{ s})$) به جواب می‌رسیم:

$$\frac{v_{(4)} + v_{(8)}}{2} = \frac{\Delta x_{(4,8)}}{\Delta t} \Rightarrow \frac{۰ + v_{(8)}}{2} = \frac{۱۲ - ۰}{8 - ۴} \Rightarrow v_{(8)} = ۶ \text{ m/s}$$



با توجه به نمودار، سرعت متحرک در لحظه $t = ۶ \text{ s}$ صفر است و جایه‌جایی متحرک در بازه ۶ s تا ۱۲ s برابر است؛ پس برای بازه $(6 \text{ s}, 12 \text{ s})$ داریم:

$$\Delta x = \frac{۱}{۲} a (\Delta t_{(6,12)})^2 + v_{(6)} \Delta t_{(6,12)}$$

$$\Rightarrow ۱۸ = \frac{۱}{۲} a (12 - 6)^2 + ۰ \Rightarrow a = ۱ \text{ m/s}^2$$

تکنیک می‌توانیم برای بازه $(۰, ۶ \text{ s})$ حرکت را بر عکس کنیم تا سرعت اولیه برابر صفر شود. در این


$$\Delta x = \frac{۱}{۲} a' t^2 \Rightarrow -18 = \frac{۱}{۲} a' t^2 \Rightarrow a' = -1 \text{ m/s}^2$$

صورت داریم:

چون حرکت را برعکس کرده ایم علامت شتاب منفی شده، پس شتاب حرکت برابر $a = 1 \text{ m/s}^2$ است.
با توجه به این که تغیر سهمی رو به بالاست، علامت شتاب حتماً مثبت است. یعنی با یک نگاه
می توانیم بگوییم ۲ و ۱ غلطاند.

گام اول از روی معادله مکان - زمان داده شده، معادله سرعت - زمان را به
دست می آوریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = -\frac{1}{2}t^2 + 12t - 4 \\ x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}a = -1 \Rightarrow a = -4 \text{ m/s}^2 \\ v_0 = 12 \text{ m/s} \end{array} \right. \xrightarrow{v = at + v_0} v = -4t + 12$$



گام دوم نمودار $v - t$ را رسم می کنیم.

مسافت طی شده در ۳ ثانیه اول

مسافت طی شده در بازه زمانی $t = 5 \text{ s}$ تا $t = 3 \text{ s}$

$$|S_1| = t = 5 \text{ s} \quad |S_2| = t = 3 \text{ s}$$

$$S_1 = \frac{12 \times 3}{2} + \frac{(5 - 3) \times 8}{2} = 18 + 8 = 26 \text{ m}$$

گام اول با مقایسه معادله سرعت - زمان داده شده با معادله سرعت - زمان در حرکت با شتاب ثابت، شتاب و سرعت اولیه را تعیین می کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} v = at + v_0 \\ v = -4t \end{array} \right\} \Rightarrow a = -4 \text{ m/s}^2 \quad v_0 = 0$$

گام دوم a و v_0 را در معادله مکان - زمان حرکت با شتاب ثابت قرار می دهیم:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}(-4)t^2 + (0)t - 3 \Rightarrow x = -2t^2 - 3$$

معادله $x - t$ در حرکت با شتاب ثابت را نوشته و با توجه به داده های مسئله،

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}at^2 + 3t + 4 \quad \text{مقادیر } v_0 \text{ و } x_0 \text{ را در آن جای گذاری می کنیم:}$$

این تابع معادله سهمی است و در نقطه رأس سهمی بیشترین مقدار را دارد. این بیشترین مقدار به ازای

$t = 4 \text{ s}$ اتفاق می افتد. در این لحظه، سرعت متحرک صفر می شود:

$$v = at + 3 = 0 \xrightarrow{t=4 \text{ s}} 4a + 3 = 0 \Rightarrow a = \frac{-3}{4} \text{ m/s}^2$$

حالا می توانیم معادله $x - t$ این حرکت را به طور کامل نوشته و با قراردادن $t = 4 \text{ s}$ در آن، مکان

$$x = \frac{-3}{4}t^2 + 3t + 4 \xrightarrow{t=4 \text{ s}} x = \frac{-3}{4}(\lambda)^2 + 3(\lambda) + 4 = 4 \quad \text{متحرک را به دست آوریم:}$$




با توجه به نمودار داده شده، شیب آن را که همان شتاب ثابت حرکت است

$$a = \frac{-9 - 12}{21 - 0} = \frac{-21}{21} = -1 \text{ m/s}^2$$

حالا می‌توانیم سرعت متوجه در لحظه‌های $t = 6 \text{ s}$ و $t = 12 \text{ s}$ را به دست آوریم:

$$v = at + v_0 \Rightarrow v = -t + 12 \Rightarrow \begin{cases} (t = 6 \text{ s}): v = -6 + 12 = 6 \text{ m/s} \\ (t = 12 \text{ s}): v = -12 + 12 = 0 \end{cases}$$



بزرگی جابه‌جایی متوجه در زمان خواسته شده برابر

است با مساحت قسمت رنگ شده در شکل مقابل:

$$S = \frac{(12 - 6) \times 6}{2} = 18 \text{ m}$$

در لحظه $S = 10 \text{ s}$ قطار A می‌ایستد، پس جابه‌جایی هر دو قطار را تا لحظه

$t = 10 \text{ s}$ محاسبه می‌کنیم:

ابتدا جابه‌جایی قطار B را تا لحظه $S = 10 \text{ s}$ به دست می‌آوریم. برای این کار نیاز به شتاب قطار B داریم:


$$a_B = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1} = \frac{-4}{16} = -\frac{1}{4} \text{ m/s}^2$$

$$\Delta x_B = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t = \frac{1}{2} \times (-\frac{1}{4}) \times 100 + 4(10) = 275 \text{ m}$$

حالا جابه‌جایی قطار A را به کمک سطح زیر نمودار محاسبه می‌کنیم:

$$\Delta x_A = -\frac{30 \times 10}{2} = -150 \text{ m}$$

يعني جهت حرکت قطار A و B مخالف یکدیگر است. به شکل مقابل توجه کنید.




پس فاصله قطار B از قطار A به سادگی محاسبه

می‌شود:

$$500 - 275 - 150 = 75 \text{ m}$$

نموداری که در این تست معرفی شده است نمودار $x - a$ است؛ یعنی

شتاب - مکان. به فرمول مستقل از زمان $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$ توجه کنید. عبارت $a\Delta x$ همان مساحت زیر نمودار در نمودار شتاب - مکان است.




(مساحت مستطیلهای رنگ شده = طول(a) × عرض(Δx))

$$S_1 + S_2 = -5 + 36 \times 2 = 22 = a\Delta x$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$$

مساحت زیر نمودار

$$v^2 - 100 = 2 \times 22 \Rightarrow v^2 = 144 \Rightarrow v = 12 \text{ m/s}$$



نمودار $a-t$ داده شده نشان می‌دهد که متحرک، دو حرکت با شتاب‌های ثابت ولی متفاوت را انجام داده است. با استفاده از نمودار $a-t$ ، نمودار $v-t$ را رسم می‌کنیم. نمودار $v-t$ این متحرک از دو خط با شیب‌های $+4$ و -5 تشکیل می‌شود:

$$v_1 = a_1 t_1 + v_0 = 4 \times 4 + 4 = 20 \text{ m/s}$$

$$v_2 = a_2 t_2 + v_1 = -5 \times (12 - 4) + 20 = -20 \text{ m/s}$$

$$S_1 = \frac{(4+20) \times 4}{2} = 48 \quad , \quad S_2 = \frac{(8-4) \times 20}{2} = 40.$$

$$|S_3| = \frac{(12-8) \times 20}{2} = 40 \Rightarrow \text{مسافت طی شده} = S_1 + S_2 + |S_3| = 128 \text{ m}$$